



口頭質詢

「攜高病毒載量的無症狀感染者可能成為在澳門特別行政區傳播新型冠 狀病毒肺炎的重要因素，急需作出篩查」

全球確診新型冠狀病毒肺炎病例已超過 100 萬，但這只是總感染人數的一小部分。人的免疫系統狀況和遺傳因素是無症狀病例的決定性重要數據。

由於存在大量仍未被發現的無症狀個案，即已感染病毒但不察覺自己染病的人，令統計數字的不確切性更為嚴重。

當這種冠狀病毒開始傳播時，我們曾希望它會像 2003 年的“沙士”病毒一樣，爆發後便會消失。但新型冠狀病毒並非如此，這種病毒或許會一直待著，不知道會持續多久，又或疫苗會在甚麼時候出現。

本月 8 日，國務院發出了關於新冠病毒無症狀感染者的管理規範，所有呈陽性結果的個案均需在兩小時內通報。該規範所針對的，是經檢測後呈陽性但未出現乾咳、發熱、肺炎或呼吸困難等症狀的患者。

訂定有關規範，是因為發現外地輸入及本地感染的無症狀患者數目有所增加。

上述規範還指出：“無症狀感染者具有傳染性，存在著傳播風險。”規



範亦要求衛生當局加強監測並對經檢測診斷為新冠病毒無症狀感染者的個案在兩小時內進行通報。

在本月 7 日與行政長官會晤時，我們曾提交書面建議，提出於首階段先對約四萬名公務人員進行檢測。無症狀感染者在不知道自己已受感染的情況下正常生活，他們沒有咳嗽或打噴嚏，但可能在感染後 14 天才傳播疾病，由此可見專家建議的社交隔離和全民使用口罩的重要性。而有關新冠病毒肺炎的最新研究顯示，由無症狀者傳播疾病的比例超過 60%。世界衛生組織至今已作出了 19 項關於無症狀者及早期症狀不明顯者（在傳染期沒有症狀表現但隨後才發展出症狀的人）傳播疾病的調查研究。

以新加坡和天津市為例，根據比利時和荷蘭研究人員於今年 3 月 18 日發表的報告，在新加坡和天津分別約有 48% 和 62% 的受感染者來自無症狀人群。

無症狀感染者由於不知道自己患病，在咳嗽和打噴嚏時一般不會對分泌物採取必要的處理措施，因而增加了傳播的風險。德國有專家指出，病毒能在鼻粘膜上（肺外）複製，所以在感染者出現症狀前，病毒已存在於唾液和分泌物中。如不知道病例總數，即有多少人從外地或於特區內受到感染，我們無法確定有關的病死率。

基於此，本人向政府提出如下質詢，並要求適時給予清楚、準確、連貫及完整的答覆：



一、內地衛生當局已開始篩查新冠病毒的無症狀感染者，同時透過國家衛生健康委員會公佈無症狀感染者的數目並實行 14 天的隔離檢疫。本澳衛生當局將採取哪些措施，以識別無症狀感染者並核實有關的病死率？例如，會否先對保安部隊人員進行篩查，然後再把措施延伸至全部公職人員，並容許市民可自發前往經衛生當局適當認可的私人化驗所或診所進行檢測？

二、世界衛生組織建議，凡有疑似體征的人都應該接受檢測。此外，如能在無症狀者身上發現新冠病毒的存在，將有助支持對他們採取隔離行動。因此，考慮到新冠病毒的傳播率甚高，衛生當局現時是否具備足夠的試劑為全澳居民進行檢測？

澳門特別行政區立法會議員

高天賜

2020 年 4 月 14 日